


Эпидемический паротит



Паротит или, как называют его в обиходе «свинка» – острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением железистых органов (слюнные железы, поджелудочная железа) и/или центральной нервной системы (ЦНС).

Паротит, в основном, является легким детским заболеванием.

Источник передачи инфекции – больной человек, выделение вируса паротита начинается за 1-2 дня до появления явных симптомов заболевания. Заражение происходит воздушно-капельным путём (при кашле, чихании, разговоре) от больного человека, который заразен от 6 суток до появления симптомов (припухлость околоушных слюнных желез).

Заболеванию «свинкой» в значительной мере подвержены дети в возрасте от трех до пятнадцати лет. Чаще эпидемическим паротитом болевают мальчики - примерно в полтора раза чаще, чем девочки. Однако заболеть «свинкой» могут и взрослые в возрасте до 40 лет, в этом случае, как правило, течение паротита более тяжелое (чем в детском возрасте).

До недавнего времени эпидемический паротит был широко распространен в мире: в среднем от 0.1% до 1% (в некоторых странах до 6%) населения переболело этой болезнью. Современные особенности эпидемиологии этого заболевания определяются осуществляемой во многих странах мира профилактикой заболевания с помощью вакцины. В большинстве стран мира в последние годы заболеваемость эпидемическим паротитом находится на уровне от 100 до 1000 на 100 000 населения с эпидемическими пиками каждые 2-5 лет. Максимальное число заболевших приходится на возраст 5-9 лет.

С 2002 года в Республике Беларусь идет тенденция к снижению заболеваний.

Это заболевание описывал еще Гиппократ, но только в 1934 году была доказана вирусная природа возбудителя. В странах с жарким климатом заболевание может наблюдаться в любое время года, в то время как в странах с умеренным климатом пик заболеваемости наблюдается зимой и весной.

Валеолог Высоцкая П.П.